

FAQ GENERALI

Come faccio a contattare il Centro Screening?

Indirizzo mail: screening@ausl.fe.it

Numero verde **800532008**, il lunedì, martedì e giovedì dalle 08.30 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 15.00, il mercoledì e il venerdì, dalle 09.00 alle 13.00.

Dove trovo il codice invito?

Il codice invito è il numero riportato sotto il codice a barre nella parte superiore sinistra della lettera di invito.

Quali appuntamenti posso prenotare e quali posso cambiare tramite questo portale?

È possibile prenotare gli appuntamenti relativi a:

- Pap e HPV test di screening

È possibile spostare un appuntamento già fissato nella lettera invito o prenotare un appuntamento se l'invito ricevuto non lo contiene.

Ci sono delle limitazioni?

Sì, tramite portale è possibile agire su un appuntamento:

- Se non si è già aderito all'invito ricevuto
- Se l'appuntamento indicato nella lettera non è stato annullato
- L'appuntamento non può essere anticipato utilizzando il portale

Perché dovrei annullare un appuntamento?

1. Se hai già eseguito il test al di fuori del programma di screening.
2. Se sei assente per un lungo periodo, è utile annullare l'appuntamento per consentire la prenotazione di un altro paziente in attesa. Al tuo rientro puoi chiedere un nuovo appuntamento contattando il Centro Screening al numero verde.
3. Non verrai comunque esclusa dal programma di screening: un nuovo invito verrà inviato tramite lettera ed anche su Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), ove attivato, con cadenza secondo fascia d'età:
 - Pap test (triennale se l'età è compresa tra 25 e 29 anni),
 - Hpv test (quinquennale se l'età è compresa tra 30 e 64 anni)

Cosa faccio se non posso agire sull'appuntamento tramite il portale?

Se non puoi agire su un appuntamento tramite il portale contatta il Centro Screening, al numero verde, che gestirà direttamente la tua posizione.

Le modifiche agli appuntamenti vengono inviati al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)?

No, per il momento le modifiche, i nuovi inviti e gli annullamenti effettuati tramite portale o dal Centro Screening non comportano l'invio di un nuovo appuntamento al FSE, su cui vengono pubblicate solo le copie degli inviti spediti via posta.

Ricorda che il promemoria della nuova prenotazione può essere stampato direttamente dal portale.

FAQ PAP TEST e HPV TEST

Posso eseguire il Pap-HPV se non ho ancora avuto rapporti sessuali completi?

Il Pap test può essere eseguito "in cieco". Significa, che per preservare l'integrità dell'imene non viene inserito lo speculum, cioè il dispositivo che permette all'ostetrica di visualizzare il collo dell'utero. Il risultato quindi può essere impreciso.

Ho subito una isterectomia (mi hanno tolto l'utero) posso fare il Pap-HPV test?

L'asportazione totale dell'utero comporta l'esclusione dal programma di screening della cervice uterina, in quanto viene a mancare la parte di organo bersaglio, la cervice. È possibile eseguire uno striscio della cupola vaginale, al di fuori del percorso di screening, con richiesta del medico curante.

Sono in gravidanza, posso eseguire il Pap-HPV test?

Sì, ma solo entro il primo trimestre di gravidanza. Oltre i tre mesi sempre a discrezione del ginecologo.

Ho appena partorito posso eseguire il Pap/HPV test?

Per una corretta esecuzione dell'esame, è bene attendere il ritorno del ciclo mestruale, in quanto il collo dell'utero torna ad essere nelle condizioni ottimali, ed è quindi il momento più opportuno. Non vi sono controindicazioni invece in corso di allattamento.

A chi mi devo rivolgere per effettuare la vaccinazione anti-HPV

Per fare la vaccinazione HPV si può rivolgere ad un punto CUP dove può prenotare la prestazione presso un ambulatorio di Igiene Pubblica. Non occorre la richiesta del medico curante.

Il vaccino disponibile copre per 9 ceppi ad alto rischio che sono 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58.

Il vaccino è composto da tre dosi, il costo a prezzo agevolato è di circa 86 euro a dose.

L'invito che ho ricevuto scade?

Sì, il nostro invito scade dopo 3 o 5 anni a seconda della sua età, ma è raccomandato farlo prima possibile per garantire la corretta frequenza di esecuzione del test.

Qual è il momento più adeguato per eseguire il Pap/HPV test?

Il periodo migliore per eseguire il test è dopo 5 giorni dal termine del ciclo mestruale. È bene astenersi dai rapporti sessuali nei 2 giorni che precedono l'esame, e non utilizzare ovuli o lavande interne.

Perché il test HPV viene fatto ogni 5 anni?

Il test HPV ricerca la presenza del virus HPV sul collo dell'utero. La presenza del virus segnala con molto anticipo lo stato di rischio di una donna di sviluppare una lesione. Il test HPV è un test molto protettivo e sensibile e ciò ha consentito di allungare i tempi di controllo tra un test e l'altro passando da tre anni (previsti per il Pap test) a cinque anni di intervallo.

È quindi molto importante partecipare allo screening e rispettarne le scadenze.

Ho appena fatto l'HPV-test ed è positivo. Posso vaccinarmi lo stesso o è inutile?

La vaccinazione è comunque possibile ed è utile per prevenire ulteriori infezioni, visto che si è esposti al virus durante tutta la vita sessualmente attiva. Perché un Papilloma Virus oncogeno possa produrre effetti è però indispensabile un'infezione persistente per molto tempo; accade infatti spesso che l'HPV-test prima positivo risulti successivamente negativo.

Perché non è utile effettuare il test di screening più frequentemente?

Perché l'infezione da HPV è molto frequente ma scompare spontaneamente nell'80% delle donne nell'arco di 12-18 mesi. Il Pap-test ogni 3 anni (età 25-29) è molto efficace per individuare lesioni del collo dell'utero. Fare i test a intervalli ravvicinati

rispetto a quelli consigliati non aumenta l'efficacia e comporta il rischio di esami e approfondimenti inutili.

Oltre al test, viene eseguita anche la visita medica specialistica?

No, in occasione del test di screening non viene eseguita la visita ginecologica, ma solo la raccolta del materiale necessario per il test.

Mi hanno richiamato per accertamenti: cosa vuol dire?

È possibile trovare informazioni su questo argomento nella sezione documentazione, opuscoli informativi: http://salute.regione.emilia-romagna.it/screening/tumori-femminili/documentazione/opuscoli-informativi/Regione_ER_Opuscolo_DopoPapTest_web.pdf

La colposcopia è un esame più preciso del Pap-test?

No, non è un esame più preciso. Nell'ambito dello screening è un esame di approfondimento diagnostico che consiste nell'osservazione del collo dell'utero a forte ingrandimento. La colposcopia è un esame indispensabile per la localizzazione delle lesioni riscontrate sul collo dell'utero e per la loro cura. Va eseguita solo dopo un Pap-test sospetto o che mostra alterazioni cellulari dubbie o in presenza di infezione da virus HPV persistente.

Dopo il Pap-test o il test HPV è possibile che si verifichino sanguinamenti?

Un lieve sanguinamento dopo il Pap-test o il test HPV è frequente ma non deve preoccupare.

Da chi viene eseguito l'esame?

L'esame viene eseguito da un'ostetrica.

Cosa fare se si hanno familiari con patologie tumorali?

Niente di particolare rispetto al programma di screening proposto: il tumore del collo dell'utero non è legato alla familiarità.

Chi ha fatto il vaccino HPV deve fare lo screening?

Sì, sarà importante continuare a fare lo screening, perché il vaccino previene oltre il 70% dei tumori del collo dell'utero, ma non il 100%.